

WAARNEMING VAN EEN GRIJZE ZEEHOND (HALICHOERUS GRYPUS) NABIJ CAP GRIS NEZ (FRANKRIJK).

E. VANLOO

Tijdens een uitstap van de Vogelwerkgroep Wielewaal Middenkust naar Cap Gris Nez op 7 oktober 1984 om er de zeevogel-trek te observeren, werd tijdens het naspeuren van de zee door Jan Milh een zeehond opgemerkt. Het dier bleef ter plaatse, vlak vóór de rotspartijen rondpleisteren. Al snel werd het door dhr. Milh herkend als een Grijze zeehond. Milh herinnerde zich de soort van een vroegere reis naar Schotland.

Opvallend bij deze zeehond was de hals die heel wat plooiën vertoonde. Ook de vorm van de kop was anders dan ik mij voorgesteld had van een zeehond, ze was eerder spits dan rond van vorm. Het specimen was minstens 1,5 m groot. Dhr. P. Tavernier kon vanop zeer korte afstand (5 tot 8 meter) meerdere dia's van het dier maken. De zeehond dook vrij veel, en bleef doorgaans meerdere minuten onder water. Op een bepaald ogenblik kwam hij boven water met een vrij grote platvis in zijn muil. Deze verorberde hij terwijl hij op zijn rug in het water lag te dobberen. Af en toe dook hij nog met vis en al onder water. Hij had blijkbaar nogal wat moeite om zijn prooi op te slokken. De zeehond bleef voor de rest van de dag in de zelfde omgeving rondzwemmen, en deed tevens enkele pogingen om op een rotsblok aan land te kruipen. Toen op een gegeven moment de achterflippers van dier zichtbaar werden konden we zien dat hij niet gemerkt was.

Eenmaal thuis werden er nog wat naslagwerken geconsulteerd om de determinatie te verifiëren (Kuckuck, 1977; van de Brink, 1978; Rappé, 1982; 1983). Al snel kwam ik tot de conclusie dat het inderdaad om een Grijze zeehond *Halichoerus grypus* ging, en wel om een subadult tot adult mannetje.

Een vraag die zich opwerpt is, van waar zou dit exemplaar afkomstig kunnen zijn? De mogelijkheid bestaat dat het specimen afgedwaald is uit een Britse populatie (b.v. van Scoby Sands nabij Yarmouth) of afkomstig is van een kolonie uit de omgeving van Quessant (Bretagne). Opmerkelijk is ook het feit dat in het daaropvolgende voorjaar niet minder dan veertig individuen van deze soort werden gezien op een zandplaat tussen

Vlieland en Terschelling (Nederland). Sommige dieren hebben er zelfs jongen geworpen (Anonymus, 1985).

Literatuur.

- Anonymus, 1985. Grijze zeehonden op het wad.- Grasduinen, mei 1985 : 24.
Brink, F.H., van den, 1978. Zoogdierengids. 4de druk, 274 pp., 32 pl., 144 + 64 kaarten. Elsevier, Amsterdam-Brussel.
Kuckuck, P., 1977. Wat vind ik aan het strand.- 258 pp., 32 pl., 111 tekstfig.. Helmond, Helmond & Altiora, Averbode.
Rappé, G., 1982. Zeehonden.- De Strandvlo 2(3) : 80-84.
Rappé, G., 1983. Het voorkomen van de Grijze zeehond langs de Belgische kust.- De Strandvlo 3(4) : 82-84.

Watervliegpleinstraat, 14
8401 Bredene

* * *

ERRATA

C. D'UDEKEM D'ACQZ

Dans mon article "Etude d'une collection de Crustacés Décapodes de Bretagne" paru dans le Strandvlo 5(4) se trouvent quelques erreurs. Que le lecteur veuille excuser ces inexactitudes.

- page 99 : lire *Pagurus prideaux* Leach, 1815 et non *P. prideaux* (Leach, 1815).
page 101 : 6ième ligne lire Sainte-Marine et non Sainte-Morène.
page 103 : 7ième ligne lire "Des débris très détériorés de *Cal-
lianassa* ont également été observés sur cette plage" et non
"Ces exemplaires...plage".
page 112 : 33ième ligne lire "plus au moins unie ...".
page 120 : 36ième ligne lire "cinquième paire de pattes avec un
merus court et un dactyle large dont le bord interne est pres-
que droit".
page 124 : 7ième ligne lire "supérieur du propode ..." et non
"supérieur du merus".
page 128 : 6 ième ligne lire "manque le premier péréiopode droit
et le troisième péréiopode gauche".

* * *